

Εργασία ομάδας Α Ανέστης Βελισαρίδης ,
Ιφιγένεια Δορδομούζη, Αντώνης Ευαγγέλου, Χαρά Ιωσηφίδου,
Σουμέλα Κανάτσιου, Αφροδίτη Κεραμιδοπούλου , Βαλάντης
Κιριφίδης , Ελένη Μακρίδου , Σοφία Μασκαλίδου , Ερσι Μούτσκα

Φυτά του δάσους

Η ομάδα μας θα σας παρουσιάσει κάποια από τα λουλούδια και τα δέντρα που βρήκαμε στην εκδρομή μας στο δασάκι της περιοχής.



Πλάτανος

Ο Πλάτανος είναι γένος ιθαγενών δέντρων του βορείου ημισφαιρίου. Οι υποκατηγορίες του είδους αυτού ανήκουν στην οικογένεια των Πλατανοειδών. Πρόκειται για μεγάλα δέντρα, με ύψος που κυμαίνεται από 30 έως 50 μέτρα, φυλλοβόλα και συναντώνται στις όχθες ποταμών και γενικά σε υγροτόπους και τοποθεσίες όπου υπάρχει νερό, μπορούν όμως να επιβιώσουν και στην ξηρασία. Το υβριδικό είδος πλάτανος του Λονδίνου προσαρμόζεται χωρίς προβλήματα σε αστικό περιβάλλον, αλλά και γενικά τα περισσότερα είδη. Στην Ευρώπη είναι γνωστός με το όνομα πλάτανος, ενώ στην Βόρεια Αμερική με το όνομα συκομουριά.



Ελένη Μακρίδου

Καλυστέγη η φρακτώδης

Καλυστέγη η φρακτώδης, ένα όμορφο αναρριχητικό αγριολούλουδο, που καλλιεργείται συχνά σαν καλλωπιστικό και το συναντάμε στους κήπους. Αναπτύσσεται σε χαμηλά υψόμετρα και σε δροσερά σημεία. Μάλιστα είναι ένα πολυετές φυτό, με βλαστό αναρριχώμενο, μήκους 1-5 μέτρα, πράσινο, λείο. Φύλλα μεγάλα, βελοειδή, κυματοειδή. Άνθη μεγάλα, λευκά, σπάνια ρόδινα, μασχαλιαία, μονήρη.



Βαλάντης Κιριφίδης

Περικοκλάδα

Η Περικοκλάδα ένα πολύ κοινό αγριολούλουδο σε όλη την Ευρώπη. Η επιστημονική της ονομασία είναι Ανθέμις η Χία. Επίσης είναι ένα όμορφο αναρριχητικό αγριολούλουδο που καλλιεργείται συχνά ως **καλλωπιστικό** και το συναντάμε σε κήπους. Η περικοκλάδα είναι πολυετές φυτό με άνθη λευκά σε σχήμα χωνιού. Η περίοδος ανθοφορίας της είναι η εποχή του καλοκαιριού, από τέλη Μαΐου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Η περικοκλάδα αναπτύσσεται κυρίως σε χαμηλότερα υψόμετρα, συνήθως σε πιο δροσερά σημεία.



Ιφιγένεια Δορδομούζη

Μαργαρίτα

Η Μαργαρίτα είναι κοινή ονομασία πολλών άγριων ή καλλιεργούμενων φυτών που ανήκουν στην οικογένεια των Συνθέτων και έχουν άνθη κατά κεφάλια, με εμφανή ακτινοειδή στεφάνη. Σε πολλές περιπτώσεις, οι μαργαρίτες φέρουν δύο ειδών άνθη: τα πρώτα έχουν ακτινωτή διάταξη και κίτρινο, συνήθως, χρώμα· περιβάλλουν τα δεύτερα, τα οποία είναι μικρά, σωληνομορφα και συναθροίζονται για να σχηματίσουν έναν δίσκο. Σημαντικό ταξινομικό γνώρισμα αποτελεί το σχήμα των βρακτίων, τα οποία βρίσκονται κάτω από το άνθος και μοιάζουν με φύλλα. Τα φύλλα των μαργαριτών μπορεί να έχουν ποικιλία σχημάτων.



Χαρά Ιωσηφίδου

Κισσός

Ο κισσός είναι γένος φυτών της οικογένειας Αραλιίδες και ανήκει στην τάξη των σκιαδανθών ή σελινωδών . Το γένος κισσός περιλαμβάνει 2, ή σύμφωνα με άλλες ταξινομήσεις, είδη, ιθαγενή της Βόρειας Αφρικής, των Καναρίων νήσων , της Ευρώπης και της Ασίας. Το γνωστότερο στην Ελλάδα είναι το καλλιεργούμενο αλλά και αυτοφυές είδος *Χέδερα η έλιξ* , κοινά κισσός.



**Αφροδίτη
Κεραμιδοπούλου**

Αριζόνα


Η Αριζόνα είναι ένα κωνοφόρο αιθαλές γρήγορης ανάπτυξης, με τελικό ύψος 10-15 m και φύλλωμα γλαυκοπράσινο. Είναι φυτό μεγάλης αντοχής στην ξηρασία και στα ασβεστώδη εδάφη και δεν προσβάλλεται εύκολα από μύκητες.



Ερσι Μούτσκα

Λεύκα ή Λεύκη

Η λεύκα ή λεύκη ή αιγείρα είναι φυλλοβόλο δέντρο, με ωσειδή φύλλα και λευκό κορμό που αναπτύσσει μεγάλο ύψος, μέχρι 50 μέτρα. Τα άνθη της σχηματίζουν κρεμαστές ταξιανθίες ιούλων και οι καρποί τους καλύπτονται από λευκό χνούδι. Ανήκουν στην οικογένεια των Ιτεοειδών ή Σαλικιδών. Οι λεύκες αναπτύσσονται σε εδάφη με μεγάλη υγρασία, όπως για παράδειγμα οι όχθες των ποταμών. Χρησιμοποιούνται ευρέως ως καλλωπιστικό δέντρο, καθώς έχουν το πλεονέκτημα ότι αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και αποκτούν μεγάλο μέγεθος και για τη κόμη τους.



Σοφία Μασκαλίδου

Ιτιά

Η **Ιτιά** είναι γένος φυτών που ανήκει στην τάξη των Ιτεωδών και στην οικογένεια των Ιτεοειδών και περιλαμβάνει 330 περίπου είδη δέντρων και θάμνων των εύκρατων κυρίως αλλά και ψυχρών περιοχών της γης. Τα δέντρα βρίσκονται κυρίως κοντά σε ποτάμια, χείμαρρους ή ρυάκια τα δε μικρά δέντρα και οι θάμνοι σε βουνά, βραχώδη εδάφη και ορισμένα είδη σε αρκτικές περιοχές. Όλα τα είδη έχουν στενά φύλλα που εναλλάσσονται, τα άνθη τους είναι αιωρούμενες ταξιανθίες και οι σπόροι τους έχουν μακριές μεταξωτές τρίχες. Μεταξύ των διαφόρων ειδών του γένους παρατηρείται φυσικός υβριδισμός και έτσι τα είδη της ιτιάς πολλαπλασιάζονται.



Σουμέλα Κανάτσιου

Σκλήθρα ή Άλνος

Ο Άλμος είναι γένος αγγειόσπερμων φυτών της οικογένειας των Βετουλίδων. Το γένος αποτελείται από 35 είδη μόνοικων δέντρων και θάμνων, μερικά από τα οποία αποκτούν μεγάλο μέγεθος, κατανεμημένα στη βόρεια εύκρατη ζώνη, ενώ μερικά είδη απαντώνται στην Κεντρική Αμερική, καθώς και στις Άνδεις. Στην Ελλάδα απαντάται το είδος Άλμος ο κολλώδης, γνωστό με τις ονομασίες κλήθρα, σκλήθρα, σκλήθρος, σκήλιθρο ή κλήθρι.



Ανέστης Βελισαρίδης


Παπαρούνα

Οι παπαρούνες βρίσκονται στις εύκρατες και ψυχρές περιοχές της Γης. Χαρακτηριστικά τους είναι τα φύλλα τους, που είτε αναπτύσσονται μέσα σε λοβό είτε είναι κομμένα σε διάφορα μέρη διασκορπισμένα, η ύπαρξη ενός γαλακτώδους υγρού στον βλαστό, καθώς και τα μεγάλα τους άνθη που φύονται μεμονωμένα σε μίσχους άφυλλους ή σε φυλλώδεις βλαστούς. Η παπαρούνα ανήκει στην τάξη των Μηκωνωδών και στην οικογένεια Μηκωνοειδών Υπάρχουν πολλά είδη παπαρούνας (100 περίπου) που είτε είναι αυτοφυή λουλούδια των αγρών είτε καλλιεργούνται.



Αντώνης Ευαγγέλου

Διάφορες εικόνες



Διάφορες εικόνες



Οι κίνδυνοι που απειλούν το δάσος

Οι κίνδυνοι που απειλούν το δάσος είναι οι διαταραχές από ενδογενείς βιοτικούς παράγοντες, οι διαταραχές από εξωγενείς βιοτικούς παράγοντες, οι διαταραχές από εξωγενείς αβιοτικούς παράγοντες, οι κακές κατασκευές έργων υποδομής, οι ρίψεις σκουπιδιών, η ληστρική υλοτομία και η ατμοσφαιρική ρύπανση



**Ανέστης Βελισαρίδης
και Ερσι Μούτσκα**